

RECOMENDACIONES para la realización de PLASMA ENRIQUECIDO EN PLAQUETAS (PRP) y/o MESOTERAPIA FACIAL (VITAMINAS, ÁCIDO HIAURÓNICO, SILICIO, DMAE, Y OTROS)

1. La semana antes del tratamiento **no debe tomar** ni Aspirina (ASA, ácido acetilsalicílico), ni AINE (antiinflamatorios no esteroideos: ibuprofeno, enantium, naproxen, voltarén).
2. Si por alguna situación ha de tomar algún analgésico debe ser Paracetamol, si duda consulte a su médico.
3. Debe informar a su médico si está bajo indicaciones de tratamientos con anticoagulantes ya sea por vía oral como el Sintrom o por vía subcutánea como la Heparina o alguna de sus formas terapéuticas.
4. El día del tratamiento no debe aplicarse ninguna crema hidratante o cosmética en la cara. En consulta se le realizará previo al tratamiento una limpieza para eliminar cualquier elemento cosmético de la piel.
5. Se le aplicará en consulta una crema anestésica de Lidocaína al 10 % durante media hora, previa al comienzo de las infiltraciones se le retirará. Si usted lo desea puede venir de su casa con la crema anestésica aplicada, la puede adquirir en farmacia con el nombre de EMLA. No debe abusar de la crema al momento de aplicársela y evitar el contacto con los ojos.
6. Posterior al tratamiento puede quedar alguna turgencia o eritema que desaparecerá en una o dos horas posteriores al tratamiento. No debe ni masajearse la zona y debe protegerse del sol.
7. Debido a la técnica de mesoterapia por infiltración puede quedar pequeños hematomas que desaparecerán en 3 o 4 días. Si cumplimos con estas recomendaciones minimizamos el riesgo de microhematomas durante la realización de la técnica.